

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS8 BERICA</p>	<p>Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA OSPEDALE S. BORTOLO Via Rodolfi 37, 36100 Vicenza</p> <p>UNITA' OPERATIVA COMPLESSA MICROBIOLOGIA</p> <p><i>Direttore: Dr. Mario Rassa</i></p>
<p>MO SEG 009 SCOTCH TEST</p>	

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DELLO SCOTCH TEST PER LA RICERCA DELLE UOVA DI ENTEROBIUS VERMICULARIS

Si raccomanda di eseguire 3 scotch test preferibilmente a giorni alterni.

1. La raccolta deve essere eseguita al momento del risveglio mattutino, prima che il soggetto defechi e si lavi.
2. Utilizzare nastro adesivo (scotch) **trasparente** e il materiale che viene ritirato in laboratorio (vetrini e contenitore).
3. Tagliare con le forbici un pezzo di scotch (5-6 cm) un poco più corto del vetrino.
Con l'aiuto del pollice (o del manico di un cucchiaio) appoggiare il nastro adesivo sull'orifizio anale comprimendo bene sulle pliche perianali per circa 15-20 secondi.
4. Staccare lo scotch dall'orifizio anale ed applicarlo ben steso sul vetrino.
5. Consegnare al laboratorio entro 2-4 ore dal prelievo oppure conservarlo in frigorifero.

Dopo il prelievo lavarsi bene le mani per evitare contaminazioni