

REGIONE DEL VENETO  ULSS8 BERICA	Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Via Rodolfi 37, I-36100 Vicenza Medicina di Laboratorio - Direttore: Dr. D. Giavarina IO005 Istruzioni per la raccolta del liquido seminale	 SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 – CERT. n° 82228
---	--	---

Sig. _____

Appuntamento il _____ alle ore _____

presso la Segreteria del Laboratorio Analisi

(Vicenza tel. 0444 753421 (dalle 12.00 alle 15.00) Noventa Vic. tel. 0444 755766)

ISTRUZIONI per la RACCOLTA del LIQUIDO SEMINALE

Prima della raccolta **osservare un periodo di astinenza sessuale di non meno di 3 e non più di 7 giorni** – per periodo di astinenza sessuale si intende lo spazio di tempo trascorso dall'ultima emissione di liquido seminale (rapporto sessuale, masturbazione o emissione spontanea notturna).

È fortemente raccomandata la raccolta in ambulatorio, all'orario concordato, mediante masturbazione ed il materiale deve essere emesso tutto e direttamente nell'apposito contenitore che va consegnato immediatamente al personale.

Se, in caso di necessità, si dovesse preferire la raccolta a domicilio, il contenitore deve essere mantenuto ad una temperatura il più possibile vicina a quella corporea (37°C) e consegnato al più presto (al massimo entro 30 minuti dalla raccolta) al laboratorio.

RISPETTARE QUESTE ISTRUZIONI ALTRIMENTI L'ESAME NON SARÀ ESEGUIBILE

REGIONE DEL VENETO  ULSS8 BERICA	Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Via Rodolfi 37, I-36100 Vicenza Medicina di Laboratorio - Direttore: Dr. D. Giavarina IO005 Istruzioni per la raccolta del liquido seminale	 SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 – CERT. n° 82228
---	--	---

INSTRUCTIONS ON HOW TO COLLECT A SEMINAL FLUID SAMPLE

Before collecting a seminal fluid sample, the patient must observe a **period of sexual abstinence of no less than 3 days but no longer than 7 days** (this is the period of time from the latest sperm emission either for sexual activity, or masturbation, or spontaneous emission during the night)

It's strongly recommended that sample collection is performed at the clinic, at the agreed time, by masturbation and all the seminal fluid must be completely and directly collected in the appropriate container and immediately handed to our personnel.

If, in case of absolute necessity, home collection is preferred, the container must be kept as close to body temperature as possible (37°C) and delivered as soon as possible (at the latest within 30 minutes from the collection) to the laboratory.

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS OTHERWISE THE TEST CAN'T BE PERFORMED

INDICATION POUR LE RECUEIL DU SPERME

Avant le prélèvement de sperme il convient de respecter une **abstinence sexuelle pendant les trois à sept jours** qui précèdent le spermogramme (on doit éviter l'émission du sperme soit par rapports sexuels que par masturbation ou pollution nocturne)

Il est fortement recommandé de procéder à la collecte à la clinique ambulatoire, par masturbation à l'heure convenue, et de décharger le matériel dans son intégralité et directement dans le récipient approprié, qui doit être remis immédiatement au personnel.

Si le prélèvement à domicile est préféré, le récipient doit être conservé à une température aussi proche que possible de la température corporelle (37°C) et remis au laboratoire le plus rapidement possible (au plus tard dans les 30 minutes suivant le prélèvement).

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS OU L'ANALYSE NE SERA PAS EFFECTUÉE