

Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale VABOREM® (meropemen/vaborbactam)

Indicazioni terapeutiche: Vaborem è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1) :

- infezione del tratto urinario complicata (cUTI), compresa pielonefrite
- infezione intra-addominale complicata (cIAI)
- polmonite nosocomiale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione (VAP).

Trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica in associazione o in sospetta associazione con una qualsiasi delle infezioni sopra elencate.

Vaborem è inoltre indicato per il trattamento di infezioni dovute a organismi Gram-negativi aerobi in adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Azienda Sanitaria: _____

Unità Operativa Richiedente: _____ Data : ____/____/____

Paziente (nome, cognome): _____ Data di nascita : ____/____/____

Sesso: F M Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito : _____

La rimborsabilità è limitata al **trattamento di pazienti adulti con accertate o sospette gravi infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE)**:

- infezione accertata del tratto urinario complicata (cUTI), compresa pielonefrite
- infezione accertata a sospetta intra-addominale complicata (cIAI)
- polmonite nosocomiale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione (VAP) accertata a sospetta
- batteriemia che si verifica in associazione a in sospetta associazione con una qualsiasi delle infezioni sopra elencate.

Trattamento di infezioni accertate dovute a organismi Gram-negativi aerobi in adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate.

Diagnosi: **Accertate gravi infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE)**

Infezione complicata del tratto urinario (cUTI), incluse le pielonefriti, con eziologia documentata mediante antibiogramma	<input type="checkbox"/>
Batteriemia che si verifica in associazione o in sospetta associazione con una qualsiasi delle infezioni sopra elencate, con eziologia documentata mediante antibiogramma	<input type="checkbox"/>
Infezioni causate da microrganismi Gram-negativi aerobi in pazienti adulti nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate, con eziologia documentata mediante antibiogramma	<input type="checkbox"/>

Diagnosi: **Accertate a sospette* gravi infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE)**

Infezione intra-addominale complicata (cIAI) con eziologia documentata/sospetta da CRE resistenti ai trattamenti di 1°linea	<input type="checkbox"/>
Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), con eziologia documentata/sospetta da CRE resistenti ai trattamenti di prima linea	<input type="checkbox"/>

* L'infezione "sospetta" può essere considerata in pazienti selezionati sulla base di criteri epidemiologici, clinici e microbiologici (colonizzazione intestinale) in accordo a raccomandazioni terapeutiche definite dal programma di stewardship antibiotica del singolo ospedale.

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco	Specialita	Dose	Durata Prevista (cfr.RCP)
Vaborem	2g/2g polvere per concentrato per soluzione per infusione	ogni 8 ore durata di infusione 3 ore	

Il dosaggio standard in soggetti con CrCl>50 mL/min 2 g. meropenem/2 g. vaborbactam ogni 8 ore (tempo di infusione: 3 h.) per una durata di 5-10 giorni nel trattamento delle cIAI e delle cUTI (inclusa la pielonefrite acuta) e di 7-14 giorni per le polmoniti acquisite in ospedale (incluse le VAP).

Nome e cognome del Medico* : _____

Recapiti del Medico* : _____

** La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in suo assenza, ad altro specialista con competenza infettivologico od hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/98).*

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE