



RICHIESTA SPET CEREBRALE PER STUDIO RECETTORI PRE-SINAPTICI DELLA DOPAMINA

UOC MEDICINA NUCLEARE

Caro Collega,

tutti i farmaci e le sostanze che si legano ai trasportatori pre-sinaptici della dopamina possono interferire con la captazione striatale del radiofarmaco utilizzato e pertanto se ne suggerisce la sospensione, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente.

Sono di seguito indicati i **farmaci interferenti** (Raccomandazioni procedurali in Neurologia dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare - vers 07/2017):

Leganti il trasportatore della dopamina (T/2 da 1 a 50h)	<ul style="list-style-type: none"> • Anfetamina • Benzatropina • Bupropione (Comm: Wellbutrin, Corzen, Quomen, Zyban) • Cocaina • Fentermina (Comm: Lipopill) • Mazindolo (Comm: Mazildene, Mazanor, Sanorex) • Metilfenidato (Comm: Ritalin, Metadate, Methylyn)
Antidepressivi: inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione (T/2 21 – 28 gg)	<ul style="list-style-type: none"> • Maprotilina (Comm: Ludiomil) • Nortriptilina (Comm: Noritren, Dominans) • Trimipramina (Comm: Surmontil) • Imipramina (Comm: Tofranil) • Dosulepina (Comm: Protiaden) • Desipramina (Comm: Nortimil) • Amitriptilina (Comm: Laroxyl, Limbitryl, Mutabon, Triptizol, Adepril, Sedans) • Clomipramina (Comm: Anafranil)
Antidepressivi: inibitori selettivi della monoamino-ricaptazione (T/2 15 – 37h)	<ul style="list-style-type: none"> • Paroxetina (Comm: Eutimil, Sereupin, Seroxat, Daparox) • Sertalina (Comm: Serad, Tatig, Zoloft) • Citalopram (Comm: Elopram, Seropram) • Escitalopram (Comm: Cipralex, Entact) • Fluvoxamina (Comm: Dumirox, Fevarin, Maveral) • Fluoxetina (Comm: Aliantil, Azur, Diesan, Flotina, Fluoseren, Fluoxenase, Fluoxin, Fluoxetine, Fluxetil, Ibexitin, Lisemir, Proxerene, Prozac, Xeredien, Zafluox)

E' suggerito un periodo di sospensione dell'assunzione dei farmaci interferenti pari ad almeno 5 volte l'emivita biologica del farmaco.

**RICHIESTA SPET
CEREBRALE PER STUDIO
RECETTORI PRE-SINAPTICI
DELLA DOPAMINA****UOC MEDICINA
NUCLEARE**

Elenco di **farmaci non interferenti** (per cui non è necessaria la sospensione):

- Amantadina (Comm: Mantadan)
- Levodopa (Comm: Larodopa, Levomet, Madopar, Sinemet)
- Metoprololo (Comm: Beprolo, Lopresor, Metotens, Seloken, Igroton, Lopresor, Selozide)
- Pergolide (Comm: Nopar, Nopar Starter)
- Primidone (Comm: Mysoline)
- Propranololo (Comm: Inderal, Inderal Graduale, Tonum, Euprovasin)
- Selegelina (Comm: Egibren, Jumex, Selecom, Seledat, Selpar, Xilopar)
- Triesilfenidile (Comm: Artane, Artane Retard)
- Entacapone (Comm: Comtan)
- Cabergolina (Comm: Cabaser)



**RICHIESTA SPET
CEREBRALE PER STUDIO
RECETTORI PRE-SINAPTICI
DELLA DOPAMINA**

**UOC MEDICINA
NUCLEARE**

**RICHIESTA SPET CEREBRALE PER LO STUDIO DEI
RECETTORI PRE-SINAPTICI DELLA DOPAMINA**

Cognome.....Nome.....

Data di Nascita.....Residenza.....

Telefono.....Telefono medico referente.....

Quesito clinico e terapia in atto:

.....
.....
.....
.....

Condizioni particolari del paziente

Claustrofobia

SI

NO

Allergia iodio

SI

NO

Epilessia

SI

NO

Episodi di perdita di coscienza

SI

NO

Terapia con Antabuse o Etiltox

SI

NO

**Farmaci interferenti
(esame eseguito in terapia?)**

SI

NO

Data

Medico Richiedente (firma e timbro)