

**IL RISCHIO DI INFEZIONE
DIMINUISCE
SIGNIFICATIVAMENTE
CON LA VACCINAZIONE!
LE VACCINAZIONI
RACCOMANDATE SONO
OFFERTE GRATUITAMENTE!**

- ▶ In occasione della vaccinazione portare la documentazione relativa a precedenti vaccinazioni e la documentazione clinica (eventuale lettera di dimissione, referti delle visite specialistiche, ed eventuali recenti esami del sangue).
- ▶ Per prenotare, spostare o disdire l'appuntamento, si raccomanda di telefonare o scrivere ai contatti riportati sul retro.
- ▶ La proposta vaccinale potrebbe variare per coloro che hanno già ricevuto alcune vaccinazioni per età o per altre condizioni di rischio.



**AMBULATORI VACCINALI
ACCESSO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO**

SEDE DI VICENZA - DISTRETTO EST

Indirizzo **OSPEDALE SAN BORTOLO** Area E - Piano Terra
Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

[✉ sisp.vicenza@aulss8.veneto.it](mailto:sisp.vicenza@aulss8.veneto.it)

SEDE DI ARZIGNANO - DISTRETTO OVEST

Indirizzo **SEDE SISP** DI ARZIGNANO
Via Kennedy, 2 - 36071 Arzignano

[✉ sisp.arzignano@aulss8.veneto.it](mailto:sisp.arzignano@aulss8.veneto.it)

**VACCINAZIONI
IN CASO DI
MALATTIE AUTOIMMUNI
INFIAMMATORIE
CRONICHE**

REUMATOLOGICHE, NEUROLOGICHE,
GASTROENTEROLOGICHE

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
UOC SISP

Per ulteriori informazioni e per i contatti telefonici delle sedi vaccinali consultare la pagina del sito internet aziendale
"Ambulatorio di Vaccinazione soggetti fragili, immunodepressi, categorie a rischio"

**Offerta vaccinale per
condizione di rischio**

LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI E INFIAMMATORIE CRONICHE

REUMATOLOGICHE, NEUROLOGICHE O GASTROENTEROLOGICHE

Più vaccini, più protezione!
CO-SOMMINISTRAZIONE IN UNA SOLA SEDUTA = OPPORTUNITÀ

► Le malattie autoimmuni infiammatorie croniche sono caratterizzate da una disregolazione del sistema immunitario che reagisce in maniera inappropriata. Si ha aumentato rischio di infezioni severe per la malattia di base, sia per l'eventuale terapia immunosoppressiva

► Sono malattie reumatologiche (*es. Artrite Reumatoide, Spondiloenteroartriti, Lupus Eritematoso Sistemico, vasculiti*); malattie neurologiche (*es. Sclerosi Multipla, Myasthenia Gravis, Sindrome di Guillain-Barré*); malattie gastrointestinali (*es. Colite Ulcerosa, Malattia di Crohn, colite non classificata*)

VACCINO PER

PER PREVENIRE

DOSI DI VACCINO

PNEUMOCOCCO	ALCUNI TIPI DI POLMONITE, INFEZIONI DIFFUSE E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO	UNA DOSE (PCV20) + UNA DOSE (PPSV23)
EPATITE B	EPATITI DA VIRUS HBV E COMPLICANZE (CIRROSI, TUMORE EPATICO)	TRE DOSI
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B	MENINGITI, POLMONITI E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO	UNA DOSE
MENINGOCOCCO A-C-W-Y	MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO A-C-W-Y	UNA DOSE
MENINGOCOCCO B	MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO B	DUE O TRE DOSI, A SECONDA DEL TIPO DI VACCINO
PAPILLOMAVIRUS	TUMORI GENITALI NELLA DONNA E NELL'UOMO, TUMORI TESTA-COLLO E CONDILOMI	TRE DOSI
MORBILLO, PAROTITE ROSOLIA *	QUESTE PATOLOGIE POTENZIALMENTE EPIDEMICHE CHE POSSONO DARE COMPLICANZE SEVERE	DUE DOSI
VARICELLA *	L'INFEZIONE PRIMITIVA DA VARICELLA, CHE PUÒ DARE COMPLICANZE SEVERE	DUE DOSI
HERPES ZOSTER	LA RIATTIVAZIONE DEL VIRUS VARICELLA (FUOCO DI SANT'ANTONIO) E LA NEVRALGIA POST-ERPETICA	DUE DOSI (RICOMBINANTE)
DIFTERITE TETANO E PERTOSSE	TETANO, DIFTERITE (ENDEMICA IN MOLTI PAESI), PERTOSSE (PERICOLOSA PER I SOGGETTI FRAGILI, E PER I NEONATI)	VERIFICA DEL CICLO BASE E RICHIAMI

* Controindicato in corso di immunosoppressione severa

QUANDO INIZIARE IL PERCORSO VACCINALE?

- alla diagnosi di malattia, prima dell'avvio delle terapie immunosoppressive.
- durante la terapia, valutando le opportunità vaccinali in base al grado di immunosoppressione.

► I pazienti fragili sono a rischio di malattia severa dovuta ai virus che causano **INFLUENZA** e **COVID-19**, soprattutto se immunosoppressi. Sono due infezioni virali prevenibili con le vaccinazioni annuali.

► VACCINAZIONE DEI **CONTATTI STRETTI** DEL PAZIENTE IMMUNOCOMPROMESSO
Alcune vaccinazioni possono essere d'aiuto nel proteggere indirettamente fragili e neonati (*Cocooning*, o strategia del bozzolo)

PARLANE CON IL TUO MEDICO!

SARANNO CONSIGLIATE DAGLI OPERATORI AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN AMBULATORIO!