

**IL RISCHIO DI INFEZIONE
DIMINUISCE
SIGNIFICATIVAMENTE
CON LA VACCINAZIONE!
LE VACCINAZIONI
RACCOMANDATE SONO
OFFERTE GRATUITAMENTE!**

- ▶ In occasione della vaccinazione portare la documentazione relativa a precedenti vaccinazioni e la documentazione clinica (eventuale lettera di dimissione, referti delle visite specialistiche, ed eventuali recenti esami del sangue).
- ▶ Per prenotare, spostare o disdire l'appuntamento, si raccomanda di telefonare o scrivere ai contatti riportati sul retro.
- ▶ La proposta vaccinale potrebbe variare per coloro che hanno già ricevuto alcune vaccinazioni per età o per altre condizioni di rischio.



**VIVO
BENE
VENETO** Piano
Regionale
Prevenzione
del Veneto

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

AMBULATORI VACCINALI

ACCESSO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

SEDE DI VICENZA - DISTRETTO EST

Indirizzo **OSPEDALE SAN BORTOLO** Area E - Piano Terra
Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

✉ sisp.vicenza@aulss8.veneto.it

SEDE DI ARZIGNANO - DISTRETTO OVEST

Indirizzo **SEDE SISP** DI ARZIGNANO
Via Kennedy, 2 - 36071 Arzignano

✉ sisp.arzignano@aulss8.veneto.it

VACCINAZIONI
IN CASO DI

ASPLENIA

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
UOC SISP

Per ulteriori informazioni e per i contatti telefonici delle sedi vaccinali consultare la pagina del sito internet aziendale
"Ambulatorio di Vaccinazione soggetti fragili, immunodepressi, categorie a rischio"

Offerta vaccinale per
condizione di rischio

LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE NELL'ASPLENIA

- ▶ **ASPLENIA:** perdita di funzione della milza. Può essere dovuta a rimozione chirurgica (SPLENECTOMIA), a malfunzionamento causato da malattie (es. anemia falciforme) o congenito.
- ▶ Il ridotto funzionamento della milza aumenta il rischio di infezioni molto severe per tutta la vita e che possono portare a complicanze fino al ricovero e, in alcuni casi, al decesso.
- ▶ **IPOSPLENISMO:** ridotto funzionamento della milza, ad esempio a causa di talassemie, di malattie epatiche croniche o di HIV/AIDS.
- ▶ Alcune vaccinazioni abbassano questo rischio e sono perciò raccomandate e gratuite.

Più vaccini, più protezione!
CO-SOMMINISTRAZIONE IN UNA SOLA SEDUTA = OPPORTUNITÀ

VACCINO PER

PER PREVENIRE

DOSI DI VACCINO

PNEUMOCOCCO

ALCUNI TIPI DI POLMONITE, INFEZIONI DIFFUSE E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

UNA DOSE (PCV20) + UNA DOSE (PPSV23)

HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

MENINGITI, POLMONITI E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

UNA DOSE

MENINGOCOCCO A-C-W-Y

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO A-C-W-Y

DUE DOSI

MENINGOCOCCO B

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO B

DUE O TRE DOSI,
A SECONDA DEL TIPO DI VACCINO

MORBILLO, PAROTITE E ROSOLIA *

QUESTE PATOLOGIE POTENZIALMENTE EPIDEMICHE CHE POSSONO DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI, SE NON IMMUNE

VARICELLA *

L'INFEZIONE PRIMITIVA DA VARICELLA, CHE PUÒ DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI, SE NON IMMUNE

DIFTERITE, TETANO E PERTOSSE

TETANO, DIFTERITE (ENDEMICA IN MOLTI PAESI), PERTOSSE (PERICOLOSA PER I SOGGETTI FRAGILI, E PER I NEONATI)

VERIFICA DEL CICLO BASE E RICHIAMI

**Controindicato in corso di immunosoppressione severa*

QUANDO INIZIARE IL PERCORSO VACCINALE?

- il prima possibile dalla diagnosi
- in caso di SPLENECTOMIA se possibile 14 giorni prima dell'intervento, *oppure* DOPO L'INTERVENTO secondo valutazione clinica

- ▶ I pazienti fragili sono a rischio di malattia severa dovuta ai virus che causano INFLUENZA e COVID-19, soprattutto se immunosoppressi. Sono due infezioni virali prevenibili con le vaccinazioni annuali.

PARLANE CON IL TUO MEDICO!

- ▶ VACCINAZIONE DEI CONTATTI STRETTI DEL PAZIENTE IMMUNOCOMPROMESSO. Alcune vaccinazioni possono essere d'aiuto nel proteggere indirettamente fragili e neonati (*Cocooning*, o strategia del bozzolo)

SARANNO CONSIGLIATE DAGLI OPERATORI AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN AMBULATORIO!