

**IL RISCHIO DI INFEZIONE
DIMINUISCE
SIGNIFICATIVAMENTE
CON LA VACCINAZIONE!
LE VACCINAZIONI
RACCOMANDATE SONO
OFFERTE GRATUITAMENTE!**

- ▶ In occasione della vaccinazione portare la documentazione relativa a precedenti vaccinazioni e la documentazione clinica (eventuale lettera di dimissione, referti delle visite specialistiche, ed eventuali recenti esami del sangue).
- ▶ Per prenotare, spostare o disdire l'appuntamento, si raccomanda di telefonare o scrivere ai contatti riportati sul retro.
- ▶ La proposta vaccinale potrebbe variare per coloro che hanno già ricevuto alcune vaccinazioni per età o per altre condizioni di rischio.



AMBULATORI VACCINALI

ACCESSO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

SEDE DI VICENZA - DISTRETTO EST

Indirizzo **OSPEDALE SAN BORTOLO** Area E - Piano Terra
Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

✉ sisp.vicenza@aulss8.veneto.it

SEDE DI ARZIGNANO - DISTRETTO OVEST

Indirizzo **SEDE SISP** DI ARZIGNANO
Via Kennedy, 2 - 36071 Arzignano

✉ sisp.arzignano@aulss8.veneto.it

**VACCINAZIONI
IN CASO DI
SINDROME DA
IMMUNODEFICIENZA
ACQUISITA**

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
UOC SISP

Per ulteriori informazioni e per i contatti telefonici delle sedi vaccinali consultare la pagina del sito internet aziendale
"Ambulatorio di Vaccinazione soggetti fragili, immunodepressi, categorie a rischio"

**Offerta vaccinale per
condizione di rischio**

LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE NELLA SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA

**Più vaccini, più protezione!
CO-SOMMINISTRAZIONE IN UNA SOLA
SEDUTA = OPPORTUNITÀ**

► Le persone con infezione da virus dell'immunodeficienza umana presentano un maggior rischio di avere forme gravi di malattie prevenibili con vaccino.

► Le vaccinazioni dovrebbero essere somministrate precocemente nel corso dell'infezione, quando la risposta immunitaria è di solito non ancora deteriorata: anche la terapia antiretrovirale può determinare un miglioramento della capacità immunitaria e della risposta vaccinale.

VACCINO PER

PER PREVENIRE

DOSI DI VACCINO

PNEUMOCOCCO

ALCUNI TIPI DI POLMONITE, INFEZIONI DIFFUSE E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

UNA DOSE (PCV20) + UNA DOSE (PPSV23)

HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

MENINGITI, POLMONITI E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

DUE DOSI

MENINGOCOCCO A-C-W-Y

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO A-C-W-Y

DUE DOSI

MENINGOCOCCO B

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO B

DUE O TRE DOSI,
A SECONDA DEL TIPO DI VACCINO

PAPILLOMAVIRUS

TUMORI GENITALI NELLA DONNA E NELL'UOMO, TUMORI TESTA-COLLO E CONDILOMI

TRE DOSI

EPATITE B

EPATITI DA VIRUS HBV E COMPLICANZE (EPATITE ACUTA, CIRROSI, TUMORE EPATICO)

TRE DOSI

EPATITE A

L'INFEZIONE DA VIRUS HAV E LE SUE COMPLICANZE (EPATITE ACUTA)

DUE O TRE DOSI,
A SECONDA DELL'IMMUNITÀ

MORBILLO, PAROTITE ROSOLIA *

QUESTE PATOLOGIE POTENZIALMENTE EPIDEMICHE CHE POSSONO DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI

VARICELLA *

L'INFEZIONE PRIMITIVA DA VARICELLA, CHE PUÒ DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI

HERPES ZOSTER

LA RIATTIVAZIONE DEL VIRUS VARICELLA (FUOCO DI SANT'ANTONIO) E LA NEURALGIA POST-ERPETICA

DUE DOSI (RICOMBINANTE)

DIFTERITE TETANO E PERTOSSE

TETANO, DIFTERITE (ENDEMICA IN MOLTI PAESI), PERTOSSE (PERICOLOSA PER I SOGGETTI FRAGILI, E PER I NEONATI)

VERIFICA DEL CICLO BASE E RICHIAMI

* Controindicato in corso di immunosoppressione severa

QUANDO INIZIARE IL PERCORSO VACCINALE?

il prima possibile dalla diagnosi

- La calendarizzazione degli appuntamenti dipende dalla **conta dei linfociti CD4, dai titoli anticorpali documentati, dal certificato di vaccinazione, da eventuali rischi individuali.**

► **MPOX** è una forma di vaiolo per cui è offerta la profilassi vaccinale pre-esposizione alle categorie previste dalla circolare ministeriale vigente.

► I pazienti fragili sono a rischio di malattia severa dovuti ai virus che causano **INFLUENZA** e **COVID-19**, soprattutto se immunosoppressi. Sono due infezioni virali prevenibili con le vaccinazioni annuali.

PARLANE CON IL TUO MEDICO!

- **VACCINAZIONE DEI CONTATTI STRETTI DEL PAZIENTE IMMUNOCOMPROMESSO**
Alcune vaccinazioni possono essere d'aiuto nel proteggere indirettamente fragili e neonati (*Cocooning*, o strategia del bozzolo)

SARANNO CONSIGLIATE DAGLI OPERATORI AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN AMBULATORIO!