

**IL RISCHIO DI INFEZIONE  
DIMINUISCE  
SIGNIFICATIVAMENTE  
CON LA VACCINAZIONE!  
LE VACCINAZIONI  
RACCOMANDATE SONO  
OFFERTE GRATUITAMENTE!**

- ▶ In occasione della vaccinazione portare la documentazione relativa a precedenti vaccinazioni e la documentazione clinica (eventuale lettera di dimissione, referti delle visite specialistiche, ed eventuali recenti esami del sangue).
- ▶ Per prenotare, spostare o disdire l'appuntamento, si raccomanda di telefonare o scrivere ai contatti riportati sul retro.
- ▶ La proposta vaccinale potrebbe variare per coloro che hanno già ricevuto alcune vaccinazioni per età o per altre condizioni di rischio.



REGIONE DEL VENETO

**VIVO  
BENE  
VENETO** Piano  
Regionale  
Prevenzione  
del Veneto

REGIONE DEL VENETO



**ULSS8**  
BERICA

AMBULATORI VACCINALI

ACCESSO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

**SEDE DI VICENZA - DISTRETTO EST**

Indirizzo **OSPEDALE SAN BORTOLO** Area E - Piano Terra  
Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

✉ [sisp.vicenza@aulss8.veneto.it](mailto:sisp.vicenza@aulss8.veneto.it)

**SEDE DI ARZIGNANO - DISTRETTO OVEST**

Indirizzo **SEDE SISP** DI ARZIGNANO  
Via Kennedy, 2 - 36071 Arzignano

✉ [sisp.arzignano@aulss8.veneto.it](mailto:sisp.arzignano@aulss8.veneto.it)

VACCINAZIONI  
IN CASO DI  
**NEOPLASIA  
EMATOLOGICA**

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
UOC SISP

Per ulteriori informazioni e per i contatti telefonici delle sedi vaccinali consultare la pagina del sito internet aziendale  
**“Ambulatorio di Vaccinazione soggetti fragili, immunodepressi, categorie a rischio”**

**Offerta vaccinale per  
condizione di rischio**

# LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE NELLA NEOPLASIA EMATOLOGICA

**Più vaccini, più protezione!**  
**CO-SOMMINISTRAZIONE IN UNA SOLA SEDUTA = OPPORTUNITÀ**

► Le malattie mielo-proliferative e displastiche, i Linfomi di Hodgkin e non Hodgkin, il mieloma multiplo, portano a immunocompromissione, in misura maggiore quando in terapia o all'avvio del percorso terapeutico per un trapianto.

► Le infezioni in questi pazienti sono gravi e le terapie antimicrobiche sono meno efficaci.  
 ► Le vaccinazioni prevengono le infezioni e vengono somministrate previa valutazione della chemioterapia, al fine di innescare la migliore risposta immunitaria ottenibile.

## VACCINO PER

## PER PREVENIRE

## DOSI DI VACCINO

### PNEUMOCOCCO

ALCUNI TIPI DI POLMONITE, INFEZIONI DIFFUSE E COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

UNA DOSE (PCV20) + UNA DOSE (PPSV23)

### HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

MENINGITI, POLMONITI E LE COMPLICANZE DATE DA QUESTO BATTERIO

UNA DOSE

### MENINGOCOCCO A-C-W-Y

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO A-C-W-Y

UNA DOSE  
 (+ EVENTUALE RICHIAMO A 8 SETTIMANE)

### MENINGOCOCCO B

MENINGITI E MENINGOCOCCEMIE DA BATTERIO DI SIEROTIPO B

DUE O TRE DOSI,  
 A SECONDA DEL TIPO DI VACCINO

### PAPILLOMAVIRUS

TUMORI GENITALI NELLA DONNA E NELL'UOMO, TUMORI TESTA-COLLO E CONDILOMI

TRE DOSI

### MORBILLO, PAROTITE ROSOLIA \*

QUESTE PATOLOGIE POTENZIALMENTE EPIDEMICHE CHE POSSONO DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI,  
 A PARTIRE DAI 24 MESI DAL FINE TERAPIA

### VARICELLA \*

L'INFEZIONE PRIMITIVA DA VARICELLA, CHE PUÒ DARE COMPLICANZE SEVERE

DUE DOSI,  
 A PARTIRE DAI 24 MESI DAL FINE TERAPIA

### HERPES ZOSTER

LA RIATTIVAZIONE DEL VIRUS VARICELLA (FUOCO DI SANT'ANTONIO) E LA NEVRALGIA POST-ERPETICA

DUE DOSI (RICOMBINANTE)

### DIFTERITE TETANO E PERTOSSE

TETANO, DIFTERITE (ENDEMICIA IN MOLTI PAESI), PERTOSSE (PERICOLOSA PER I SOGGETTI FRAGILI, E PER I NEONATI)

DUE DOSI

*\* Controindicato in corso di immunosoppressione severa*

## QUANDO INIZIARE IL PERCORSO VACCINALE?

- alla diagnosi di malattia, prima dell'avvio della chemioterapia;
- a tre-sei mesi dalla fine della chemioterapia;
- durante una terapia cronica, valutando le opportunità vaccinali in base al grado di immunosoppressione.

► I pazienti fragili sono a rischio di malattia severa dovuta ai virus che causano **INFLUENZA** e **COVID-19**, soprattutto se immunosoppressi. Sono due infezioni virali prevenibili con le vaccinazioni annuali.

► **VACCINAZIONE DEI CONTATTI STRETTI DEL PAZIENTE IMMUNOCOMPROMESSO**  
 Alcune vaccinazioni possono essere d'aiuto nel proteggere indirettamente fragili e neonati (*Cocooning*, o strategia del bozzolo)

**PARLANE CON IL TUO MEDICO!**

**SARANNO CONSIGLIATE DAGLI OPERATORI AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN AMBULATORIO!**