



## RICHIESTA DI SCINTIGRAFIA CEREBRALE CON TRACCIANTI RECETTORIALI PRE-SINAPTICI (STRIASCAN)

Caro Collega,  
tutti i farmaci e le sostanze che si legano ai trasportatori pre-sinaptici della Dopamina possono interferire con la captazione striatale del STRIASCAN e pertanto se ne suggerisce la sospensione, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente.  
Sono di seguito indicati i **farmaci interferenti** (Raccomandazioni procedurali in Neurologia dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare - vers 06/2012):

<b>Leganti il trasportatore della dopamina (T/2 da 1 a 50h)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anfetamina</li> <li>• Benzatropina</li> <li>• Bupropione (CORZEN, QUOMEN, ZYBAN)</li> <li>• Cocaina</li> <li>• Fentermina (LIPOPILL)</li> <li>• Mazindolo (MAZILDENE)</li> <li>• Metilfenidato (RITALIN)</li> </ul>
<b>ANTIDEPRESSIVI: inibitori <u>non selettivi</u> della monoamino-ricaptazione (T/2 21 – 28 gg)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maprotilina (LUDIOMIL)</li> <li>• Nortriptilina (NORITREN, DOMINANS)</li> <li>• Trimipramina (SURMONTIL)</li> <li>• Imipramina (TOFRANIL)</li> <li>• Dosulepina (PROTIADEN)</li> <li>• Desipramina (NORTIMIL)</li> <li>• Amitriptilina (LAROXYL, LIMBITRYL, MUTABON, TRIPTIZOL, ADEPRIL, AMITR, SEDANS)</li> <li>• Clomipramina (ANAFRANIL)</li> </ul>
<b>ANTIDEPRESSIVI: inibitori <u>selettivi</u> della monoamino-ricaptazione (T/2 15 – 37h)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paroxetina (EUTIMIL, SEREUPIN, SEROXAT, DAPAROX)</li> <li>• Sertalina (SERAD, TATIG, ZOLOFT)</li> <li>• Citalopram (ELOPRAM, SEROPRAM)</li> <li>• Escitalopram (CIPRALEX, ENACT)</li> <li>• Fluvoxamina (DUMIROX, FEVARIN, MAVERAL)</li> <li>• Fluoxetina (ALIANFIL, AZUR, DIESAN, FLOTINA, FLUOXEREN, FLUOXENASE, FLUOXIN, FLUOXETINE, FLUXETIL, IBEXITIN, LISEMIR, PROXERENE, PROZAC, XEREDIEN, ZAFLUOX)</li> </ul>


**Unità Operativa di Medicina Nucleare**
*Direttore f.f. Dr. Marta Zaroccolo*

- ✓ È suggerito un periodo di sospensione della assunzione dei farmaci interferenti pari ad almeno 5 volte l'emivita biologica del farmaco.
- ✓ Nel caso in cui non fosse possibile sospendere la terapia specificare nella richiesta il tipo di farmaco, la durata della terapia e la posologia ed apporre la dicitura "esame in terapia".
- ✓ Non è necessario sospendere i farmaci agonisti e antagonisti della dopamina che agiscono a livello post-sinaptico (vedi tabella seguente).

Elenco di **farmaci non interferenti** (non è necessaria la sospensione):

- Amantadina (MANTADAN)
- Levodopa (LARODOPA, LEVOMET, MADOPAR, SINEMET)
- Metoprololo (BEPROLO, LOPRESOR, METOTENS, SELOKEN, IGROTON-LOPRESOR, SELOZIDE)
- Pergolide (NOPAR, NOPAR STARTER)
- Primidone (MYSOLINE)
- Propranololo (INDERAL, INDERAL GRADUALE, TONUM, EUPROVASIN)
- Selegelina (EGIBREN, JUMEX, SELECOM, SELEDAT, SELPAR, XILOPAR)
- Triesilfenidile (ARTANE, ARTANE RETARD)
- Entacapone (COMTAN)
- Cabergolina (CABASER)


**RICHIESTA DI SCINTIGRAFIA CEREBRALE CON TRACCIANTI  
 RECETTORIALI PRE-SINAPTICI (STRIASCAN)**

Cognome..... Nome.....

Data di Nascita..... Residenza.....

Telefono..... Telefono medico referente.....

Quesito clinico e terapia in atto:

.....

.....

.....

.....

**Condizioni particolari del paziente**
**Claustrofobia**
**SI**
**NO**
**Allergia iodio**
**SI**
**NO**
**Epilessia**
**SI**
**NO**
**Episodi di perdita di coscienza**
**SI**
**NO**
**Terapia con Antabuse o Etiltox**
**SI**
**NO**
**Farmaci interferenti  
 (esame eseguito in terapia?)**
**SI**
**NO**

Data

 Medico Richiedente  
 (timbro e firma)