	<p align="center">Regione Veneto – Azienda ULSS n. 8 Berica Ospedale S. Bortolo Vicenza</p> <p align="center">Unità Operativa complessa di Gastroenterologia U.O. Semplice di Endoscopia Digestiva Direttore UOC: Dr. Paolo Pallini Direttore UOS : Dr.ssa Luisa Milan</p>	<p align="right">Rev.:02 Del Febbraio 2023</p>
---	---	--

SCHEDA INFORMATIVA PER IL CONSENSO INFORMATO



Gentile paziente,

La procedura alla quale Le consigliamo di sottoporsi necessita di un Suo consenso, perché Lei possa, attraverso questo foglio informativo ed il colloquio con il medico, esprimere per iscritto la Sua decisione. In particolare Lei riceverà informazioni dettagliate su:

- le indicazioni dell'esame*
- la sede ed il tipo di esame, il significato, gli esiti e le eventuali / possibili complicanze che la procedura, al quale Le consigliamo di sottoporsi, può presentare.*


Le saremo grati se, prima dell'esame, leggerà con attenzione quanto qui di seguito riportato e sottoporrà alla nostra attenzione ogni Sua domanda, dubbio o chiarimento che, se risolti, possa metterLa in grado di prendere una decisione informata, responsabile, serena e consapevole.

LA SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Presso UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva è possibile praticare la sedazione per eseguire le procedure endoscopiche. La Sedazione o più propriamente Sedo-Analgesia Procedurale (SAP) è quella procedura che utilizza farmaci per indurre una riduzione dello stato di coscienza ed una riduzione della sensibilità a stimoli fastidiosi/dolorosi per poter eseguire indagini diagnostiche e/o terapeutiche come le procedure endoscopiche .

È indispensabile che il paziente venga presso la nostra Unità Operativa **accompagnato da una persona adulta che avrà cura di accompagnarlo a casa**. Per tutta la giornata dopo aver eseguito la sedazione il paziente **NON potrà guidare**, svolgere attività impegnative o pericolose in quanto potrebbe avere un rallentamento dei riflessi e/o delle amnesie.

SEDAZIONE o SEDO ANALGESIA PROCEDURALE: può essere somministrata dal Medico che eseguirà l'endoscopia. Può consistere nella somministrazione di un solo farmaco per via endovenosa, il **Midazolam**, della categoria delle benzodiazepine, che ha effetti ansiolitici, sedativi

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS8 BERICA</p>	<p>Regione Veneto – Azienda ULSS n. 8 Berica Ospedale S. Bortolo Vicenza</p> <p>Unità Operativa complessa di Gastroenterologia U.O. Semplice di Endoscopia Digestiva Direttore UOC: <i>Dr. Paolo Pallini</i> Direttore UOS : <i>Dr.ssa Luisa Milan</i></p>	<p><i>Rev.:02</i> <i>Del Febbraio 2023</i></p>
--	---	--

e di **amnesia anterograda**, effetto desiderato e sfruttato in molte procedure come l'endoscopia sia diagnostica che terapeutica. Se viene somministrato tale farmaco il paziente viene tenuto in osservazione per un breve periodo (di solito non più di 2 ore) nelle sale di "risveglio" del Servizio e poi può tornare a casa **accompagnato**.

In alcuni casi può essere praticata, sempre dal Medico Endoscopista, con la somministrazione di due farmaci, sempre via endovenosa, un farmaco della categoria degli oppiacei, la **Meperidina o Petidina**, che ha un effetto analgesico, associata al Midazolam.

In entrambi i casi il paziente ha la sensazione di essere un po' assopito, è però in grado di rispondere e collaborare col personale medico ed infermieristico, anche se nella quasi totalità dei casi non conserva ricordo di quanto avvenuto. Il paziente viene monitorato con il pulsio-ossimetro che informa costantemente sullo stato di ossigenazione e sulla frequenza cardiaca.

Il paziente con la Sedo Analgesia Procedurale non avverte sensazione di dolore e/o di fastidio ed ha una sensazione piacevole di rilassamento e non conserva ricordo di quanto è avvenuto.

Sia il Midazolam che la Meperidina hanno un farmaco **antagonista** che può, in caso di necessità, essere somministrato per eliminarne rapidamente gli effetti.

SEDAZIONE CON ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA:

A volte, per le condizioni cliniche del paziente o per la particolare tipologia di procedura terapeutica o per la lunghezza della procedura interventistica è necessario chiedere l'assistenza del Collega Anestesista il quale permette di utilizzare farmaci differenti che richiedono una assistenza più specialistica e garantiscono una maggiore profondità della riduzione dello stato di coscienza e maggiore analgesia (riduzione della sensibilità agli stimoli fastidiosi/dolorosi)

Il Medico Anestesista decide a seconda dei casi quali farmaci somministrare, egli può decidere di somministrare anche farmaci di uso esclusivamente anestesiologicalo (come il propofol; ketamina od altri).



Il paziente in sedazione con assistenza anestesiologicala si addormenta per la durata dell'indagine e quindi non ha alcuna consapevolezza durante l'esame, non avverte quindi dolore e non conserva un ricordo di quanto è avvenuto.

Viene monitorato durante tutto l'esame dal Medico Anestesista.

Dopo l'esame viene osservato per un breve periodo (di solito non più di 2 ore) nella sala risveglio e poi può tornare a casa **accompagnato**, una volta ottenuta l'autorizzazione dall'Anestesista

Per i casi in cui sarà praticata una sedazione con assistenza anestesiologicala è richiesto il digiuno assoluto da almeno 6 ore, anche se si tratta di un esame delle basse vie digestive (la colonscopia).

La sedazione con Assistenza Anestesiologicala può essere richiesta al nostro servizio in casi selezionati e motivati, deve essere concordata anticipatamente in quanto sarà cura del personale dell'Endoscopia fornire l'appuntamento nei giorni in cui è presente il Medico Anestesista. Al paziente verrà richiesto di eseguire una visita Anestesiologicala prima di effettuare l'esame endoscopico in sedazione con assistenza Anestesiologicala.

 	<p>Regione Veneto – Azienda ULSS n. 8 Berica Ospedale S. Bortolo Vicenza</p> <p>Unità Operativa complessa di Gastroenterologia U.O. Semplice di Endoscopia Digestiva <i>Direttore UOC: Dr. Paolo Pallini</i> <i>Direttore UOS : Dr.ssa Luisa Milan</i></p>	<p><i>Rev.:02</i> <i>Del Febbraio 2023</i></p>
--	---	--

Sempre quando ci si reca per eseguire un esame di endoscopia digestiva, ma a maggior ragione se si desidera la sedazione, è indispensabile informare i medici delle patologie pregresse o in atto, di tutta la terapia farmacologica, di eventuali allergie, di eventuali serie alterazioni degli esami del sangue.

Per la sedazione **è sempre indispensabile essere accompagnati da persona adulta in grado di guidare**, perché dopo la sedazione (sia senza che con assistenza anestesiológica) i riflessi sono molto rallentati e quindi è assolutamente vietato guidare e/o svolgere attività pericolose per sé o per gli altri.