



RICHIESTA DI SCINTIGRAFIA CEREBRALE CON TRACCIANTI RECETTORIALI PRE-SINAPTICI (STRIASCAN)

Caro Collega,
 tutti i farmaci e le sostanze che si legano ai trasportatori pre-sinaptici della Dopamina possono interferire con la captazione striatale del STRIASCAN e pertanto se ne suggerisce la sospensione, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente.
 Sono di seguito indicati i **farmaci interferenti** (Raccomandazioni procedurali in Neurologia dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare - vers 06/2012):

Leganti il trasportatore della dopamina (T/2 da 1 a 50h)	<ul style="list-style-type: none"> • Anfetamina • Benzatropina • Bupropione (CORZEN, QUOMEN, ZYBAN) • Cocaina • Fentermina (LIPOPILL) • Mazindolo (MAZILDENE) • Metilfenidato (RITALIN)
ANTIDEPRESSIVI: inibitori <u>non selettivi</u> della monoamino-ricaptazione (T/2 21 – 28 gg)	<ul style="list-style-type: none"> • Maprotilina (LUDIOMIL) • Nortriptilina (NORITREN, DOMINANS) • Trimipramina (SURMONTIL) • Imipramina (TOFRANIL) • Dosulepina (PROTIADEN) • Desipramina (NORTIMIL) • Amitriptilina (LAROXYL, LIMBITRYL, MUTABON, TRIPTIZOL, ADEPRIL, AMITR, SEDANS) • Clomipramina (ANAFRANIL)
ANTIDEPRESSIVI: inibitori <u>selettivi</u> della monoamino-ricaptazione (T/2 15 – 37h)	<ul style="list-style-type: none"> • Paroxetina (EUTIMIL, SEREUPIN, SEROXAT, DAPAROX) • Sertalina (SERAD, TATIG, ZOLOFT) • Citalopram (ELOPRAM, SEROPRAM) • Escitalopram (CIPRALEX, ENTACT) • Fluvoxamina (DUMIROX, FEVARIN, MAVERAL) • Fluoxetina (ALIANFIL, AZUR, DIESAN, FLOTINA, FLUOXEREN, FLUOXENASE, FLUOXIN, FLUOXETINE, FLUXETIL, IBEXITIN, LISEMIR, PROXERENE, PROZAC, XEREDIEN, ZAFLUOX)


Unità Operativa di Medicina Nucleare
Direttore f.f. Dr. Marta Zaroccolo

- ✓ È suggerito un periodo di sospensione della assunzione dei farmaci interferenti pari ad almeno 5 volte l'emivita biologica del farmaco.
- ✓ Nel caso in cui non fosse possibile sospendere la terapia specificare nella richiesta il tipo di farmaco, la durata della terapia e la posologia ed apporre la dicitura "esame in terapia".
- ✓ Non è necessario sospendere i farmaci agonisti e antagonisti della dopamina che agiscono a livello post-sinaptico (vedi tabella seguente).

Elenco di **farmaci non interferenti** (non è necessaria la sospensione):

- Amantadina (MANTADAN)
- Levodopa (LARODOPA, LEVOMET, MADOPAR, SINEMET)
- Metoprololo (BEPROLO, LOPRESOR, METOTENS, SELOKEN, IGROTON-LOPRESOR, SELOZIDE)
- Pergolide (NOPAR, NOPAR STARTER)
- Primidone (MYSOLINE)
- Propranololo (INDERAL, INDERAL GRADUALE, TONUM, EUPROVASIN)
- Selegelina (EGIBREN, JUMEX, SELECOM, SELEDAT, SELPAR, XILOPAR)
- Triesilfenidile (ARTANE, ARTANE RETARD)
- Entacapone (COMTAN)
- Cabergolina (CABASER)


**RICHIESTA DI SCINTIGRAFIA CEREBRALE CON TRACCIANTI
 RECETTORIALI PRE-SINAPTICI (STRIASCAN)**

Cognome..... Nome.....

Data di Nascita..... Residenza.....

Telefono..... Telefono medico referente.....

Quesito clinico e terapia in atto:

Condizioni particolari del paziente

Claustrofobia	SI	NO
Allergia iodio	SI	NO
Epilessia	SI	NO
Episodi di perdita di coscienza	SI	NO
Terapia con Antabuse o Etiltox	SI	NO
Farmaci interferenti (esame eseguito in terapia?)	SI	NO

Data

 Medico Richiedente
 (timbro e firma)