

PROVA SCRITTA N. 2

- PREECLAMPSIA -

Definizione di preeclampsia	
Nello spazio tra le parentesi scrivi in riferimento ai dati forniti, il quadro diagnostico corretto	1. Presenza di ipertensione arteriosa preesistente la gravidanza o che insorge prima della 20 w di gestazione, con riscontro di valori pressori in più di una misurazione a distanza di almeno 4/6 ore (.....) 2. Preeclampsia con anemia emolitica, elevazione degli enzimi epatici e piastrinopenia (.....) 3. Valori di pressione arteriosa sistolica $\geq$ a 140 mmHg e un valore di pressione arteriosa diastolica $\geq$ a 90 mmHg in almeno due misurazioni in assenza di proteinuria insorta dopo la 20 w in donne precedentemente non ipertese (.....) 4. Comparsa di convulsioni tonico-cloniche generalizzate non correlate al grado di ipertensione e alla gravità della proteinuria che possono manifestarsi in gravidanza durante il parto e in puerperio (.....)
Indica almeno 5 fattori di rischio della "preeclampsia"	1. 2. 3. 4. 5.
Indica almeno 4 segni e sintomi della preeclampsia	1. 2. 3. 4.

Indica almeno 5 atti clinico - assistenziali da attuare nella preeclampsia	1. 2. 3. 4. 5.
Indica almeno 3 farmaci impiegati nella preeclampsia (principi attivi)	1. 2. 3.

- L'INDUZIONE MEDICA DEL TRAVAGLIO DI PARTO -

Quali tra le situazioni cliniche in elenco sono "generalmente" considerate indicazioni "assolute" all'induzione al travaglio di parto e quali indicazioni "relative" Scrivere nello spazio a fianco: - Assolute - Relative (Secondo le Linee Guida SIGO/AOGO/AGUI)	• disordini ipertensivi • restrizione crescita fetale • gravidanza post-termine (tra le 41 e 42w) • colestasi gravidica • oligoamnios/polidramnios • diabete • eccessiva crescita fetale • M.E.F. (morte endouterina del feto) • rottura intempestiva delle membrane a termine • gravidanza gemellare • richiesta materna, motivi logistici o sociali
--	---