

PIANO VACCINALE PER ASPLENIA (assenza o malfunzionamento milza)

Lo stato di asplenia anatomica (assenza della milza) o funzionale (malfunzionamento della milza da anemia falciforme, emoglobinopatie....) determina un maggiore rischio di sepsi fulminante con elevata mortalità.

Gli agenti più frequentemente coinvolti sono lo *Streptococcus pneumoniae*, la *Neisseria meningitidis* e lo *Haemophilus influenzae* di tipo b.

Al fine di proteggersi da queste evenienze, al paziente asplenico sono fortemente raccomandate alcune vaccinazioni, in particolare:

- anti-pneumococco
- anti-meningococco coniugato
- anti-emofilo
- antinfluenzale

Laddove possibile, al fine di ottenere la massima efficacia, è opportuno vaccinare prima dell'intervento di splenectomia.

Il piano vaccinale sotto riportato è di riferimento per l'adulto. Per la popolazione pediatrica vanno utilizzati i vaccini e cicli raccomandati per età. Tutte le vaccinazioni vengono offerte in regime di gratuità.

*Gli intervalli tra le dosi possono essere ridotti o aumentati in base alle necessità nel rispetto delle schede tecniche dei singoli prodotti.

**necessaria se ciclo con Trumenba

