

PIANO VACCINALE PER SOGGETTI con positività HIV

Le persone con infezione da HIV presentano un maggior rischio di avere forme gravi di malattie prevenibili con vaccino. Le vaccinazioni dovrebbero essere somministrate precocemente nel corso dell'infezione perché in questa fase la risposta immunitaria è di solito non ancora deteriorata. La HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy) determina una ricostituzione della capacità immunitaria che può migliorare la risposta vaccinale. Per le nuove diagnosi con grave soppressione della risposta immunitaria, le vaccinazioni dovrebbero essere rimandate, se possibile, fino a quando la terapia antiretrovirale determini un miglioramento della situazione immunitaria.

Al fine di proteggersi dal rischio di infezioni sono fortemente raccomandate alcune vaccinazioni, in particolare:

- anti-pneumococco
- anti-emofilo
- anti-zoster
- anti-papillomavirus
- anti-epatite B ed A
- anti-meningococco coniugato

Lo specialista di riferimento potrà fornire indicazioni su quali effettuare prioritariamente in base al rischio personale.

Il piano vaccinale sotto riportato è di riferimento per l'adulto. Per la popolazione pediatrica vanno utilizzati i vaccini e cicli raccomandati per età. Tutte le vaccinazioni vengono offerte in regime di gratuità.

*1M=1 mese. Gli intervalli tra le dosi possono essere ridotti o aumentati in base alle necessità nel rispetto delle schede tecniche dei singoli prodotti.

**se si utilizza ciclo con Trumenba a 2 dosi: 0-6 mesi

