

PIANO VACCINALE PER SOGGETTI IMMUNODEPRESSI

Lo stato di immunodepressione determina un maggiore rischio di contrarre infezioni. Può essere il risultato di stati patologici che comportano immunodeficienza o può essere indotta per circostanze che richiedono terapia immunosoppressiva (es. trapianto d'organo solido, malattie neoplastiche, malattie reumatologiche..).

Al fine di proteggersi dal rischio di infezioni, al paziente immunodepresso sono fortemente raccomandate alcune vaccinazioni, in particolare:

- anti-pneumococco
- anti-meningococco coniugato
- anti-emofilo
- antinfluenzale
- anti-zoster

A chi necessita di terapia immunosoppressiva è raccomandato per una maggiore efficacia somministrare il ciclo vaccinale se possibile entro 4-6 settimane prima dell'inizio del trattamento. In base alle indicazioni fornite dagli specialisti può essere raccomandato avviare le vaccinazioni anche in corso di terapia.

Il piano vaccinale sotto riportato è di riferimento per l'adulto. Per la popolazione pediatrica vanno utilizzati i vaccini e cicli raccomandati per età. Tutte le vaccinazioni vengono offerte in regime di gratuità.

*Gli intervalli tra le dosi possono essere ridotti o aumentati in base alle necessità nel rispetto delle schede tecniche dei singoli prodotti.

**necessaria se ciclo con Trumenba

