

PIANO VACCINALE PER SOGGETTI che hanno concluso la CHEMIOTERAPIA

Le cure chemioterapiche hanno l'effetto di deprimere il sistema immunitario ma una volta sospese vi è una graduale ripresa nell'arco di 6 mesi. L'utilizzo dei farmaci chemioterapici determina anche una riduzione del livello anticorpale ottenuto con i cicli vaccinali effettuati prima dell'inizio delle terapie ma non determina una completa perdita della memoria immunologica. Per ottenere un innalzamento dei livelli protettivi anticorpali per malattie prevenibili con vaccino è indicato un richiamo delle vaccinazioni effettuate o il ciclo completo se mai effettuate.

In particolare è importante richiamare la protezione per:

- anti-difterite-tetano-pertosse-polio
- anti-epatite B
- anti-pneumococco
- anti-meningococco coniugato
- anti-emofilo
- anti morbillo-parotite-rosolia-varicella
- antinfluenzale
- altre vaccinazioni in base all'età, comorbidità, stato di rischio (papillomavirus, epatite A, herpes zoster..)

Il piano vaccinale sotto riportato è di riferimento per l'adulto. Per la popolazione pediatrica vanno utilizzati i vaccini e cicli raccomandati per età. Tutte le vaccinazioni vengono offerte in regime di gratuità.

*Gli intervalli tra le dosi possono essere ridotti o aumentati in base alle necessità nel rispetto delle schede tecniche dei singoli prodotti.

