

Prendi contatto con le sedi vaccinali per
programmare le vaccinazioni:

Vicenza via Albinoni:

☎ 0444-229524

Lunedì dalle 14.30 alle 16.30

Martedì e Venerdì dalle 8.30 alle 11.00

✉ vaccinazioni.albinoni@aulss8.veneto.it

Noventa Vicentina:

☎ 0444-755627

Lunedì e Giovedì dalle 11.00 alle 12.00

✉ sisp.noventa2@aulss8.veneto.it

Camisano Vicentino:

☎ 0444-756819

Lunedì dalle 9:00 alle 11:00

Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00

✉ vaccinazioni.camisano@aulss8.veneto.it

Sandrigò:

☎ 0444-756485

Martedì e Venerdì dalle 8:30 alle 10:30

✉ sisp.sandrigò@aulss8.veneto.it

Lonigo:

☎ 0444-431340

Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00

✉ vaccinazioni.lonigo@aulss8.veneto.it

Valdagno:

☎ 0445-423116

Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00


✉ vaccinazioni.valdagno@aulss8.veneto.it

Arzignano:

☎ 0444-708633

Lunedì e Giovedì - dalle 8.30 alle 12.00

✉ vaccinazioni.arzignano@aulss8.veneto.it



Ulteriori informazioni:

Per informazioni ci si può rivolgere al medico curante, al proprio ginecologo e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 8 Berica.

Per altre informazioni sono consultabili i seguenti siti web:

www.vaccinarsi.org

www.salute.gov

www.epicentro.iss.it

Bibliografia: Circolare del Min. della salute del 12/11/2019 "Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza-Aggiornamento novembre 2019"; DGR 990/2023 Calendario vaccinale per età della Regione Veneto.



VACCINAZIONI E GRAVIDANZA

Le vaccinazioni sono uno degli strumenti
preventivi più efficaci per prevenire lo
sviluppo di alcune malattie infettive



I VACCINI COME RISORSA PER LA SALUTE

Proteggi te stessa e la tua
famiglia



Vaccinazioni per le donne in gravidanza

Influenza:

L'influenza stagionale aumenta il rischio di ospedalizzazione materna e di altri problemi che possono compromettere il normale decorso della gravidanza. La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente alle donne in qualsiasi epoca della gravidanza. La vaccinazione in gravidanza ha un effetto protettivo sui neonati attraverso il passaggio di anticorpi dalla madre.

Pertosse:

La pertosse contratta sotto l'anno di vita può essere molto grave e persino mortale. Nei primissimi mesi di vita il bambino può essere protetto solo dagli anticorpi ricevuti dalla madre adeguatamente vaccinata durante l'ultimo trimestre di gravidanza. Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione è dalla 27°esima alla 36°esima settimana di gestazione, idealmente intorno alla 28°esima settimana. A ogni gravidanza è consigliato eseguire un richiamo anche se la donna è già stata vaccinata o ha contratto la pertosse.

La vaccinazione anti pertosse viene offerta in formulazione trivalente difterite-tetano-pertosse.

Queste vaccinazioni possono essere cosomministrate in totale sicurezza; inoltre sono sicure anche se la donna sta allattando.

Se sei una mamma, consiglia la vaccinazione al partner, agli zii, e a tutte le persone che si prenderanno cura di te e della tua famiglia



Vaccinazioni in previsione di una gravidanza

Prima di una gravidanza è importante che le donne siano protette nei confronti delle principali malattie esantematiche (morbillo-parotite-rosolia-varicella), dato l'elevato rischio per il nascituro se contratte in gravidanza.

Morbillo, parotite, rosolia:


Se contratte in gravidanza queste malattie possono essere responsabili di serie conseguenze per il nascituro. Per i bambini e per gli adulti sono raccomandate due dosi di vaccino a distanza di almeno 4 settimane per una protezione completa e duratura.

Varicella:

La varicella, se contratta in gravidanza, in particolare nel pre-parto è pericolosa per il nascituro. Se non si ha mai contratto la malattia e non si è stati vaccinati è consigliata la vaccinazione. Sono raccomandate due dosi di vaccino a distanza di almeno 4 settimane.

Dopo queste vaccinazioni è necessario attendere un mese prima di intraprendere una gravidanza.

VACCINAZIONE COVID: da effettuare in base alle raccomandazioni Ministeriali. Parlane con il tuo medico, il tuo ginecologo o chiedi informazioni al Servizio Vaccinazioni.



Vaccinazioni per le donne in età fertile

Difterite, tetano e pertosse:

Un richiamo di questa vaccinazione viene raccomandato ogni 10 anni a tutta la popolazione con lo scopo di limitare la circolazione del batterio della pertosse, evitare che la difterite torni a circolare e proteggere il singolo individuo nei confronti del tetano.

Papillomavirus:

La vaccinazione è consigliata per prevenire lesioni precancerose e alcune forme tumorali come il tumore al collo dell'utero. Il calendario vaccinale della regione Veneto prevede l'invito attivo e gratuito ai dodici anni d'età. Se non è già stato eseguito il ciclo, la vaccinazione è gratuita dalla coorte di nascita 1996 fino al compimento dei 26 anni d'età.

Morbillo, parotite, rosolia e varicella:

Queste malattie possono dare serie conseguenze a tutte le età. Viene raccomandata, a tutti i soggetti non protetti, la pianificazione della vaccinazione.

*Se sei interessato a saperne di più riguardo le vaccinazioni ti consigliamo di partecipare agli incontri informativi con l'Assistente Sanitario. Le informazioni sono reperibili nella sezione **"Gravidanza e nascita - gli incontri informativi"** presente nell'home page del sito ULSS8 Berica.*